

MAS4 COVER NITRO P

POUR LES SEMIS PRÉCOCES ET
POURVOYEUR D'AZOTE

- **BONNE RESTITUTION AZOTE**
Avec 80% légumineuses
- **BON RENDEMENT BIOMASSE**
+2 tMS dans la plupart des conditions
- **CONVIENT A TOUTES SITUATIONS**
Complémentarité entre espèces



8% Brassicacées

10% Divers

82% Fabacées

COMPOSITION DU MÉLANGE

Espèces	Variété / type	% en poids	Nb grains/ m ² à densité min	Sensibilité au gel à maturité	Bénéfices
Moutarde brune	BRASSICA JUNCEA LATE	8%	45	-5 °C	Moutarde tardive, limite les risques de monté en graines, moins de lignification, rapide d'installation et structure le sol, capte l'azote résiduel
Phacélie	PHACELIA TANACETIFOLIA	10%	84	-7 °C	Très bonne implantation, protège et structure le sol, un nid pour les pollinisateurs
Trèfle incarnat	TRIFOLIUM INCARNATUM	22%	81	-15 °C	Installation sur l'automne pour permettre une bonne protection du sol, produira de l'azote pour la culture suivante. Adapté aux différents types de sols, bonne valeur alimentaire.
Vesce de Bengale	VICIA BENGHALENSIS	25%	8	-8 °C	Agressive sur l'automne pour protéger le sol et apporter de l'azote, facile à détruire
Vesce commune	VICIA SAT WINTER	35%	8	-12 °C	

RESTITUTION DES ÉLÉMENTS À LA PROCHAINE CULTURE

	Biomasse du couvert végétal		
	3t MS	3t MS	3t MS
Azote (kg/ha)	45	55	70
Phosphore (kg/ha)	15	20	25
Potassium (kg/ha)	100	135	170
Carbone (t/ha)	0.4	0.5	0.70

EFFETS DU MÉLANGE

Biomasse	8
Biodiversité	8
Structure du sol	9
Azote	9
Pollinisateur	6
Facilité de destruction	9
Rapidité d'installation	6

1-3 sensible – faible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant – excellent

SEMIS & CULTURE

Période de semis	Mi Août-Fin Septembre	Pour un semis précoce et une production supplémentaire d'azote. Le semis idéal se fait entre la mi-août et la fin septembre à 1-2 cm de profondeur.
Taux de semis	12-15 kg/ha = 227 g/m²	
Profondeur de semis	1-2 cm	
Durée	Annual	