

MAS4 COVER NITRO T

POUR LES SEMIS D'AUTOMNE /
HIVER ET POURVOYEUR
D'AZOTE

- **BONNE RESTITUTION AZOTE**
Plus de 90% de légumineuses
- **POUR LES SEMIS TARDIFS**
Pour les semis derrière maïs grain
- **STRUCTURATION DU SOL**
Complémentarité entre espèces



92% Fabacées

8% Brassicacées

COMPOSITION DU MÉLANGE

Espèces	Variété / type	% en poids	Nb grains/ m ² à densité min	Sensibilité au gel à maturité	Bénéfices
Pois cultivé	ASTEROID	50%	16	-10 °C	ASTEROID est un pois fourrager type hiver permettant une bonne implantation et une production de printemps forte en protéines pour augmenter la MAT du méteil.
Radis chinois	RAPHANUS SATIVUS DAIKON	8%	21	-7 °C	Effet très structurant et limite l'érosion, piège à azote et facilité de destruction. Sert de tuteur pour les espèces volubiles.
Vesce commune	VICIA SAT WINTER	42%	33	-12 °C	

RESTITUTION DES ÉLÉMENTS À LA PROCHAINE CULTURE

	Biomasse du couvert végétal		
	3t MS	3t MS	3t MS
Azote (kg/ha)	60	84	96
Phosphore (kg/ha)	20	30	40
Potassium (kg/ha)	140	195	235
Carbone (t/ha)	0.5	0.7	0.80

EFFETS DU MÉLANGE

Biomasse	8
Biodiversité	3
Structure du sol	8
Azote	9
Pollinisateur	3
Facilité de destruction	9
Rapidité d'installation	7

1-3 sensible – faible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant – excellent

SEMIS & CULTURE

Période de semis	Mi Septembre-Mi Novembre	Pour semis tardifs après le maïs grain et production supplémentaire d'azote. Le semis idéal se fait entre la mi-septembre et la fin octobre à 2 cm de profondeur. Il peut être associé à 20 kg avec de la féverole.
Taux de semis	30-50 kg/ha = 70 g/m ²	
Profondeur de semis	2-2 cm	
Durée	Annual	