

# MAS4 NUTRI VV

UNE ASSOCIATION DE  
LÉGUMINEUSES ANNUELLES  
AVEC DE LA VESCE VELUE

- MELANGE DE LEGUMINEUSES ANNUELLES**

Différents types de trèfles pour augmenter la production de protéines

- ASSOCIATION AVEC DES RGI**

Pour augmenter le rendement et valoriser la conservation du silo

- SÉCURISER LA PRODUCTION DE PROTÉINES**

La vesce velue sécurisera la teneur en protéines à la récolte

100% Fabacées

## COMPOSITION DU MÉLANGE

| Espèces          | Variété / type       | % en poids | Nb grains/<br>m <sup>2</sup> à densité<br>min | Sensibilité<br>au gel à<br>maturité | Bénéfices                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesce velue      | VICIA VILLOSA        | 70%        |                                               | -12 °C                              |                                                                                                                                                                                      |
| Trèfle incarnat  | TRIFOLIUM INCARNATUM | 15%        |                                               | -15 °C                              | Installation sur l'automne pour permettre une bonne protection du sol, produira de l'azote pour la culture suivante. Adapté aux différents types de sols, bonne valeur alimentaire . |
| Trèfle squarosum | TRIFOLIUM SQUARROSUM | 15%        |                                               | -10 °C                              | Trèfle résistant au froid, à floraison tardive et avec un bon potentiel de rendement. Bien adapté aux sols sableux et argileux.                                                      |

## UTILISATION

| Ensilage | Enrubannage | Foin | Pâturage | Grain |
|----------|-------------|------|----------|-------|
| +++      | +++         | ++   | +++      | ++    |

## SEMIS & CULTURE

|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Période de semis    | Début Septembre - Début Octobre | Ne pas ensiler en pur. Pour des semis précoces (août/septembre), il est conseillé d'avoir un équilibre 50 % de MAS4 NUTRI VV et 50 % de RGI diploïde. Pour des semis plus tardifs, augmenter la partie de MAS4 NUTRI VV à hauteur de 60 %. Bien raisonner la fertilisation azotée (surtout lors de l'association avec des RGI). Attention aux reliquats de sulfonylurées. Une fertilisation classique peut entraîner un développement trop rapide des RGI, qui peuvent étouffer les trèfles. |
| Taux de semis       | 15 - 20 kg/ha                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondeur de semis | 1 - 2 cm                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durée               | Annual                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |