

TARDIO

ASTON

RENDIMIENTO Y ADAPTACIÓN

- **RENDIMIENTO ASEGURADO**
Tanto en grano como en silo
- **PLANTA ROBUSTA**
Y equilibrada
- **GRAN VIGOR DE NASCENCIA**
Para garantizar su buena implantación

Available with seed applied solution



CARACTERÍSTICAS

Utilización	Grano Ensilado Biogas
FAO	500-600 - 500-600
Madurez de grano (32% H ₂ O)	2010 °C
Madurez de ensilado (32 % MS)	1730 °C
Floración*	1010 °C

Suma de la temperatura (base 6°C)

AGRONOMÍA

Vigor de nascencia	9
Stay green	7
Secado de grano	7
Tolerancia a la sequía	8
Estabilidad	8

TOLERANCIA A ENFERMEDADES

Helminthosporium	6
Fusarium (planta)	7
Fusarium (mazorca)	8

1-3 sensible – malo | 4-6 medio – bueno | 7-9 tolerante – excelente

MORFOLOGIA

Incersion de mazorca	Media
Altura de planta	Media
Tipo de grano	Dentado
N° filas	14 - 16
N° Granos/fila	42 - 46
PMG	338 g
Ear type	FLEX (flexible)

YIELD & QUALITY

Energy type	Energía rápida
Almidón	8
Energía	8
DNDF	7
Biogas yield	8

CULTIVATION

	Condiciones óptimas	Condiciones limitantes
Adaptación	++++	++++
Densidad grano (pl/ha)	85 000 Plantas/ha	75 000 Plantas/ha
Densidad ensilado (pl/ha)	95 000 Plantas/ha	85 000 Plantas/ha

ASTON is well balanced plant with a big cob (16-18 rows).
ASTON can grow in warm condition thanks its good adaptation to the stress