

MAS 83SU

TECHNICAL ADAPTABILITY IN EARLY GROUP

- **EARLINESS/YIELD POTENTIAL RATIO**
Adaptability in all territories
- **HIGH OIL CONTENT**
To secure quality
- **FLEXIBILITY TO WEED CONTROL**
To forget weed problems

Saatgutbehandlung verfügbar mit



EIGENSCHAFTEN

Blüte	Mittelfrüh
Reifegruppe	Früh
Öltyp	Linolsäurehaltig

AGRONOMIE

Jugendentwicklung	8
Standfestigkeit	7
Trockentoleranz	7

KRANKHEITSTOLERANZEN

Orobanche	E
Mehltau	RM9
Sclerotinia (collar)	6
Sclerotinia Korb	7
Sclerotinia	6
Phoma	7
Phomopsis	9
Verticillium	7

1-3 empfindlich | 4-6 mittel – gut | 7-9 tolerant – exzellent

MORPHOLOGIE

Pflanzenhöhe	Hoch
TKG	Mittelhoch
Kopfform	Leicht konvex
Kopfhaltung	Aufrecht

ERTRAG & QUALITÄT

Ölgehalt	45 - 47 %
----------	-----------

KULTIVIERUNG

	Optimale Bedingungen	Ungünstige Bedingungen
Eignung	++++	++++
Pflanzendichte	65 000 - 68 000 Körner/ha	50 000 - 55 000 Körner/ha