

SULFONOR

ПРОДУКТИВНО

- **РАНЕН ЦЪФТЕЖ**
един от най-ранните в сегмента на трибенурон метил
- **НИСЪК РЪСТ**
Със здраво стъбло
- **ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО**
За повишаване на рентабилността



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цъфтеж	Ранен
Зрелост	Ранен
Тип масленост	Линолов

АГРОНОМИЯ

Начално развитие	9
Устойчивост на полягане	9
Толерантност на засушаване	8

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ

Оробанче	Е
Мана	RM9
Sclerotinia (collar)	7
Склеротиния (пита)	9
Стъблена склеротиния	9
Фома	7
Фомопсис	8
Вертицилийум	8

9 = много толерантен, 1 = чувствителен

MORPHOLOGY

TKW	Средно-високо
Форма на питата	Изпъкнала
Положение на питата	Изправена/права

YIELD & QUALITY

Маслено съдържание	45 - 47 %
--------------------	-----------

CULTIVATION

	Оптимални условия	Неблагоприятни условия
Адаптивност	++++	++++
Density at harvest	6 500 семена/дка	6 000 семена/дка